


ТУБЕРКУЛЁЗ

- КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ИНФИЦИРОВАН МИКОБАКТЕРИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗА
- У **5-10%** ИНФИЦИРОВАННЫХ РАЗВИВАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- ТУБЕРКУЛЕЗ - ОДНА ИЗ **10** ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ ВО ВСЕМ МИРЕ
- БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ УМИРАЮТ **ДВЕ ТРЕТИ** ЗАБОЛЕВШИХ



ЛАТЕНТНАЯ

(СКРЫТАЯ) ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ




- МБТ* В ОРГАНИЗМЕ ЕСТЬ, НО ОНИ «СПЯТ»
- САМОЧУВСТВИЕ ХОРОШЕЕ
- НЕТ СИМПТОМОВ ТУБЕРКУЛЕЗА
- НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ

ЛЮДИ С ЭТОЙ ФОРМОЙ БОЛЕЗНИ
НЕ МОГУТ
ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ

АКТИВНЫЙ

ТУБЕРКУЛЕЗ



- МБТ В ОРГАНИЗМЕ ЕСТЬ, И ОНИ АКТИВНЫ
- УХУДШАЕТСЯ САМОЧУВСТВИЕ
- СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ВЫРАЖЕНЫ
- ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ

ЛЮДИ С ЭТОЙ ФОРМОЙ БОЛЕЗНИ
МОГУТ
ЗАРАЗИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ

ЗА ГОД БОЛЬНОЙ АКТИВНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ИНФИЦИРУЕТ **БОЛЕЕ** 10-15
ЧЕЛОВЕК

НО! ПРИ НАРУШЕНИИ РАБОТЫ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ ВОЗМОЖЕН ПЕРЕХОД БОЛЕЗНИ В
ОПАСНУЮ **АКТИВНУЮ ФОРМУ ТУБЕРКУЛЕЗА**

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ДОЛГО ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ СЛАБО ВЫРАЖЕНЫ, ЭТО - ПРИЧИНА ПОЗДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

- КАШЕЛЬ
- ЛИХОРАДКА
- НОЧНОЙ ПОТ
- ПОТЕРЯ ВЕСА

ВАЖНО РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ С ЛАТЕНТНОЙ И АКТИВНОЙ ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА



КАК ВЫЯВИТЬ ЛАТЕНТНУЮ ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ ?

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ

ВНУТРИКОЖНЫЕ

- ПРОБА МАНТУ
- ДИАСКИНТЕСТ



ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ :

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТУБЕРКУЛИНА
- ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, **КРОМЕ** СЛУЧАЕВ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НА ТУБЕРКУЛЕЗ
- СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ (ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ)
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ПЕРИОД КАРАНТИНА В ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
- ИНТЕРВАЛ МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

ПРОБИРОЧНЫЕ (IN VITRO)

- КВАНТИФЕРОНОВЫЙ ТЕСТ
- (QuantiFERON) T-SPOT.TB



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРОВОДИТСЯ В ПРОБИРКЕ , В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА НИЧЕГО НЕ ВВОДИТСЯ
- ВЫСОКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ (ОШИБОЧНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧЕСКИ ИСКЛЮЧЕН)
- ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕНЕЕ СУБЪЕКТИВНА
- МОЖНО ПРОВОДИТЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
- НЕ ДАЕТ ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ

